



گروه پزشکی شفا
بیمارستان و زایشگاه



کورتاژ

تدوین: کاظمی (واحد آموزش سلامت)

زیر نظر: دکتر پور برفه ای

پاییز ۱۴۰۰



۱- تب

۲- ترشحات زیاد و غیر طبیعی

۳- درد زیاد در قسمت زیر شکم

۴- افزایش خونریزی

۵- ترشحات بد بو

۶- هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی، ضعف، بیحالی، تب و غیره.

* توجه داشته باشید عمل دیلاتاسیون و کورتاژ هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می توانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.

* بعد از کورتاژ یک نمونه جهت پاتولوژی فرستاده می شود که یک هفته پس از عمل با برگه پذیرش نمونه جهت دریافت جواب به آزمایشگاه مراجعه کنید.

منبع: بیماریهای زنان کیسترن ۲۰۰۹



۳- در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا ۶ ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری مجدد حتما تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود.

ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

۴- بعد از کورتاژ لازم است قرص های آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت ۳ ماه برای جبران کم خونی خود استفاده نمایید.

در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه نمایید:


دیلاتاسیون و کورتاژ؟

باز کردن دهانه ی رحم و تخلیه ی نسج آن را گویند. این عمل یکی از شایعترین عملهای زنان است.

می تواند برای تشخیص یا درمان خونریزیهای غیر طبیعی زنان به کار رود.

خونریزی غیر طبیعی از واژن چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیر طبیعی از واژن گردد. خونریزی غیر طبیعی به خونریزی گفته می شود که در زمان خارج از انتظار ما اتفاق بیافتد.




۱

موارد خونریزی غیر طبیعی واژن:

- ۱- بعد از تماس جنسی.
- ۲- هنگام یائسگی یا بعد از آن.
- ۳- در بین دو دوره ی قاعدگی به صورت لکه بینی.
- ۴- ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه ی اول حاملگی.



عمل دیلاتاسیون و کورتاژ ضمن بیهوشی عمومی یا بی حسی ناحیه ای، بعد از اینکه شما را در وضعیت مناسبی قرار دادند که دسترسی به رحم آسان باشد، انجام می شود.



ابتدا دهانه ی رحم را متسع (باز) می کنند، در صورتیکه علت خونریزی سقط است، محصولات

۲

حاملگی را خارج می نمایند و اگر علت خونریزی نامعلوم است از بافت رحم نمونه (بیوپسی) بر می دارند.

اگر پزشک شما ناحیه ی مشکوکی را یافت، او ممکن است یک بخش یا همه ی آن را خارج کند و به آزمایشگاه بفرستد. یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش می کند، تا سرطان یا دیگر بیماری های احتمالی را تشخیص دهد.



مراقبت های بعد از عمل:

- ۱- از انجام کارهای سنگین بعد از عمل جراحی خودداری کنید.
- ۲- از داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی تا ۴۰ روز خودداری کنید.

۳