



گروه پزشکی شفا
بیمارستان و زایشگاه



SHAFI HOSPITAL SHIRAZ
IRAN

آندوسکوپی و مراقبت‌های مربوط به آن

تدوین: کاظمی (واحد آموزش سلامت)

زیر نظر: دکتر امرالهی

پاییز ۱۴۰۰



"با آرزوی سلامتی برای شما"

منابع: Endoscopy. Available from:
http://www.mdconsult.cim/das/patient/body_17/1296486798/10089/60147-329755536 Accessed: March ۲۰۱۰ ۱۳۹۵

- تنفس و فشار خون شما در طی انجام آزمایش تحت نظر خواهد بود.

پس از انجام اندوسکوپی ممکن است:

- تا یک ساعت قادر به قورت دادن نیستید. زمانی که توانایی بلعیدن و قورت دادن را بدست آوردید می‌توانید غذا بخورید.

- ممکن است، تا چند روز گلو درد داشته باشید.

- در صورت استفاده از داروی آرام بخش (میدازولام) ساعت از رانندگی و انجام ۲۴ ساعه اندوسکوپی تا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری فرمائید.

عوارض و خطرات احتمالی: در موارد بسیار نادر احتمال بروز خونریزی، آسیب به روده، معده و مری وجود دارد.

درمان جایگزین: به جای این روش می‌توان از عکسبرداری نیز استفاده کرد ولی عکسبرداری فقط جنبه تشخیصی دارد و ضمناً قدرت تشخیص عکسبرداری کمتر از اندوسکوپی است نقش درمانی ندارد.

مراحل حین اندوسکوپي:


- ابتدا شما روی تخت دراز خواهید کشید. در صورتی که نیاز به تزریق داروهای آرامبخش احساس شود، پرستار برای شما یک راه وریدی باز می کند (رگ می گیرد) و آن را به سرم وصل می کند و داروی آرامبخش از طریق سرم به شما تزریق می شود، البته اغلب موارد اندوسکوپي بدون نیاز به تزریق داروهای آرامبخش انجام می شود.

- در مرحله بعد داروی بی حسی به درون حلق شما اسپری خواهد شد این دارو مزه بدی دارد و ممکن است احساس بی حسی و تورم در حلق داشته باشید. داروی بی حسی توانایی بلعیدن (قورت دادن) را از بین خواهد برد.

- مطمئن باشید در حین انجام آزمایش تنفس شما دچار مشکل نخواهد شد.

- با قرار دادن یک محافظ در دهان از دندانهای شما محافظت خواهد شد.

- به هنگام وارد شدن لوله و انجام معاینه در شکم احساس پری و فشار خواهید کرد.



آمادگی های قبل از اندوسکوپي:

- از ۸ ساعت قبل از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید (به استثنا داروهای تجویز شده توسط پزشک)

- در موارد اورژانس محتویات معده توسط دستگاه مکنده (ساکشن) تخلیه خواهد شد.

- در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین، آسپرین و پلاویکس پزشک خود را مطلع نمایید.

- دندان مصنوعی قبل از انجام فرآیند از دهان خارج گردد.

- مدارک پزشکی شامل اندوسکوپي های قبلی و جواب آزمایشات خود را همراه داشته باشید.

از طریق اندوسکوپي پزشک می تواند مری، معده و دوازدهه (اثنی عشر) شما را به وضوح ببیند.

این تست برای افرادی استفاده می شود که:

- دچار سوزش سر معده، درد شکم و خونریزی غیر طبیعی هستند.

- تشخیص زخم، پلیپ و توده های دستگاه گوارش فوقانی

- گاهی از این تست در مواردی که غذا یا جسم خارجی در مری گیر کرده باشد استفاده می شود.

- در موارد کنترل خونریزی و برداشتن پلیپ نیز استفاده می شود.

روش انجام اندوسکوپي: روش انجام این فرآیند

بصورتی است که یک لوله قابل انعطاف (مجهز به منبع نور و گیرنده ویدئویی) را از طریق دهان وارد دستگاه گوارش می کنند. علاوه بر مشاهده داخلی دستگاه گوارش توسط این روش، امکان نمونه برداری از مخاط نیز وجود دارد. این تست حدود ۳۰ دقیقه طول می کشد.